

คู่มือการใช้งาน  
หุ่นชิ้นจำลองบาดแผล

Adult Emergency Wound Kit + Decubitus Ulcer Kit + Surgical Site Infection Level 1  
(WK100 + WK145 + 800-657)

เป็นชุดจำลองบาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ สำหรับสร้างสถานการณ์ช่วยผู้บาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ และเพลกัดทับตับตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4 สำหรับฝึกการประเมินความรุนแรงของบาดแผลและการดูแล รักษาที่เหมาะสมเพื่อให้การผิวฟื้นเป็นไปอย่างสมจริงยิ่งขึ้น วัสดุทำจาก Silicone พิเศษเพื่อความสมจริง มีความทนทาน และยืดหยุ่นได้ดี

- ชุดบาดแผลมี 11 ชนิด เป็นจำนวนชิ้นล้วน 18 ชิ้น ประกอบด้วยชนิดของบาดแผล ได้แก่



- บาดแผลถูกตัดและบาดแผลลอกขนาดเล็ก (Small skin incision and skin abrasion)
- บาดแผลถูกตัดขนาดกลาง Skin incision (cut) medium size
- บาดแผลลอกขนาดใหญ่ (Large Skin abrasion)
- บาดแผลถูกถีบกระดูกหัก (Compound bone fracture)
- บาดแผลถูกมีดบาด (Medium Knife wound) และบาดแผลลอกขนาดกลาง (Skin abrasion)

- บาดแผลลึกที่ต้นขา (Deep wound in thigh)
  - บาดแผลพกขาและอักเสบที่ศีรษะ (Contusion to the head with inflammation)
  - บาดแผลฉีกขาดไม่ถึงกระดูกด้านซ้าย (Left side boneless laceration)
  - บาดแผลเย็บที่ต้นขา (Thigh suture)
2. บาดแผลผ่าตัด



3. แผลกดทับตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 4



#### 4. อุปกรณ์ที่ต้องใช้



- น้ำยา Skin tite ขาวสีฟ้า ส่วนที่ 1
- น้ำยา Skin tite ขาวสีเหลือง ส่วนที่ 2
- ถ้วยผสมน้ำยา (ไม่ได้ให้มาก)
- ที่คั่นน้ำยา
- ถุงมือ ควรใส่ถุงมือทุกครั้งขณะผสมน้ำยารวมทั้งขณะติดตั้งชิ้นส่วน bard แล้วเข้ากับหุ่น

#### 5. การเริ่มใช้งาน

- ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอลล์เช็ดทำความสะอาดพื้นที่จะทำการติดตั้งชิ้นส่วนผิวน้ำ
- เทน้ำยา Skin tite ขาวสีฟ้า ผสมขาวสีเหลือง โดยปริมาณที่ผสมขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของ bard แล้ว
- คนน้ำยาให้เข้ากัน (สภาพน้ำยาข้นจะเหนี่ยวคั่นล้ำยกาว)
- ทาน้ำยาที่ผสมแล้วบนพื้นผิวน้ำของหุ่นตรงที่จำเป็นที่ต้องการติดตั้ง bard แล้ว
- วาง bard แล้วลงบนตำแหน่งที่ทาน้ำยาคัดลงเบาๆ ให้สนิทกับผิวน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
- หลังเสร็จสิ้นการฝึกใช้มือค่อยๆ ดึง bard แล้วออกแล้ว ใช้น้ำลับเช็ดทำความสะอาดบริเวณผิวน้ำของหุ่น ผึ้งให้แล้ว ทาเป็น ใช้กระดาษหรือผ้าห่อ ก่อนเก็บลงกระเบื้อง

#### 6. มีกระเป่ารรจุ